



Améliorer les pratiques d'incubation et d'élevage dans un élevage de volaille de basse-cour peut s'avérer efficace pour accroître les rendements, renouveler régulièrement le troupeau et faire en sorte que les poussins dépassent les huit premières semaines, cruciales, de leur existence. Dans les élevages villageois, où les volailles bénéficient souvent de peu de soin, près de la moitié des poussins meurent au cours des deux premiers mois. Cela réduit considérablement les revenus des petits aviculteurs, dont beaucoup sont des femmes.

Des améliorations simples telles qu'une meilleure stabulation et une meilleure alimentation peuvent suffire à faire la différence. Un nouveau manuel, paru dans la collection Agrodok, explique comment atteindre ces résultats dans les systèmes d'incubation tant naturels qu'artificiels. Il donne des repères pour choisir les races et informe sur les vaccinations et les coûts. Le dernier chapitre fait le point sur l'alimentation et la santé, soulignant l'importance de pratiques sanitaires rigoureuses, et une section d'aide au diagnostic oriente les éleveurs en cas de problème.

Amélioration de l'incubation et de l'élevage des poussins

Par J. de Feyter, E. Kok, I. Puls, A. Vink et F. Wafadar

CTA/Agromisa, 2011, 84 p.

ISBN 978-90-8573-115-3

CTA n° 1674

5 unités de crédit