





Programme Céréales  
Traditionnelles

01 BP 910 BOBO 01

# BONDOFA



<b>Nom : BONDOFA</b>		<b>Synonyme : FBH 34 SR</b> (Farako Bâ Hybride n°34 Streak Resistant)	
<b>Origine</b>		<b>Type variétal</b> : Hybride variétal	
Génétique	: EV8444 SR x EV8422 SR		
Géographique	: Farako Bâ, Burkina (IN.E.R.A)		
<b>Caractères agro-morphologiques</b>		<b>Caractères du grain</b>	
Cycle semis-floraison mâle	: 58 jours après semis	Couleur	: Blanc
Cycle semis-maturité	: 97 jours en grain	Texture	: Semi-corné
Hauteur de la plante	: 215 cm	Forme	: Denté
Hauteur d'insertion de l'épi	: 110 cm	<b>Utilisation</b> :	
Résistance à la verse	: bonne	Humaine	: Tô, couscous, bouillie
Résistance à la casse	: bonne	Animale	: grain
<b>Maladies et ennemis des cultures</b>		Industrielle	: sémoulerie
Helminthosporiose	: Bonne	<b>Rendement en grain</b> : 6.5 t/ha	
Rouille	: Bonne	<b>Vocation</b>	
Viroses	: Résistante au MSV	<i>Aire de culture</i>	: Pluviométrie ≥ 900 mm
Foreurs	: tolérante		: zones irriguées
Insectes de stock	: test en cours	<i>Intensification</i>	: Agriculture semi-intensive
Striga	: test en cours		: Agriculture intensive
Autres	:		:

<b>Points forts</b>	<b>Points faibles</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistance au MSV</li> <li>• Bonnes potentialités de rendement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exige de bonnes conditions</li> <li>• Renouvellement annuel des semences</li> </ul>

Source : SANOU J., 1993 : Choisir sa variété de maïs au Burkina Faso. Doc. CNRST/INERA- Burkina Faso